

CYMINA PLUS

Insetticida Concentrato Emulsionabile (CE)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO:
Reg. Ministero della Sanità n°19896

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 2 - Ottobre 2024

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Cipermetrina (cis/trans 40/60) (CAS: 52315-07-8)	10,0 %
Tetrametrina (CAS: 7696-12-0)	2,5 %
Piperonil butossido (CAS: 51-03-06)	12,5 %
Coformulanti e acqua q.b. a	100 g

CARATTERISTICHE

Cymina Plus è un insetticida concentrato facilmente diluibile in acqua, a rapido effetto abbattente, snidante e con un ottimo effetto residuale.

Cymina Plus è efficace contro insetti volanti e striscianti quali mosche, zanzare (compresa la zanzara tigre), tafani, vespe, calabroni, blatte, scarafaggi, acari, pulci, cimici, zecche, scorpioni, tignole, punteruoli, ecc.

DESTINAZIONE D'USO

Cymina Plus è indicato per il trattamento in agglomerati urbani, viali, parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni (comprese cantine, garage e ripostigli), negozi, **edifici pubblici e privati**, scuole, asili d'infanzia, caserme, cinema, teatri, mense, alberghi, ristoranti, cucine, bar, **ospedali**, case di cura, case di riposo, magazzini e depositi di sostanze alimentari, stalle, fabbricati rurali, magazzini e locali destinati alla produzione di sigarette e allo stivaggio di tabacchi, ambienti, aree e settori industriali (**industrie alimentari**, carta, tessili, tabacchifici), depositi rifiuti, mezzi di trasporto (aerei, navi, treni, autobus), **aree verdi** (cespugli, tappeti erbosi, siepi, viali alberati, piante ornamentali).

Cymina Plus non è da impiegare su o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale. Non trattare in presenza di sostanze alimentari. Non trattare in presenza di animali.

DOSI D'IMPIEGO

Cymina Plus viene impiegato alle seguenti dosi:

· per insetti volanti (Zanzare)	0,2 % - 0,4 %
· per insetti volanti (Vespe e Mosche)	1,0 %
· per insetti striscianti (Formiche, Pulci)	0,5 % - 1,0 %
· per insetti striscianti (blatte)	0,5 %
· per aracnidi (zecche e scorpioni)	1,0 %

Per l'utilizzo con termonebbiogeno, è consigliata la diluizione al 4% in solvente adeguato, per il trattamento di un volume di 2.500 m³ per litro di soluzione.



INFESTANTI TARGET

INSETTI VOLANTI

Mosche, Zanzare, Vespe, Tafani, Calabroni

INSETTI STRISCIANTI

Blatte, Scarafaggi, Pulci, Cimici

INSETTI DELLE DERRATE

Tignole, Punteruoli

ARACNIDI

Zecche, Scorpioni

ATTREZZATURE CONSIGLiate

Spruzzatori Inox B&G
Gloria 505T Profiline
Gloria 410 TKS Profiline
ULV B&G
ULV Airfog



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):

H351: Sospettato di provocare il cancro

H319: Provoca grave irritazione oculare

H373: Può provocare danni agli organi (sistema nervoso) in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.