ADVION® GEL SCARAFAGGI

Esca in Gel

AUTORIZZAZIONE BIOCIDA (PT18):
n° IT/2011/00002/MRA

INSETTICIDI — Scheda Tecnica

Revisione 1 – Novembre 2025

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Indoxicarb puro (CAS: 173584-44-6)	*0,6 %*
(miscela S:R)	*1,14 %*
Cofurmalanti q.b. a	*100 g*



CARATTERISTICHE

Advion gel scarafaggi è destinato al controllo di tutte le specie di scarafaggi tra cui i principali sono: blattella germanica (*Blattella germanica*), blatta orientale (*Blatta orientalis*), blatta americana (*Periplaneta americana*).

E per il controllo delle principali specie di pesciolino d'argento in ambienti interni: Pesciolino d'argento (*Lepisma saccharina*), e pesciolino d'argento coda lunga (*Ctenolepisma longicaudata*).

Advion gel scarafaggi può anche essere utilizzato all'interno di appropriati contenitori di esche o attrezzature simili, in modo da assicurarsi che il prodotto sia inaccessibile ai bambini o agli animali domestici.

Advion gel scarafaggi va applicato in piccole gocce nelle aree infestate.

DESTINAZIONE D'USO

Advion gel scarafaggi può essere usato in aree interne ed esterne, in locali dove siano immagazzinati alimenti e mangimi, dentro e fuori abitazioni, siti industriali, uffici, magazzini, mense, ospedali, scuole, asili, alberghi, mezzi di trasporto, edifici commerciali, o in ogni luogo dove possono trovare rifugio gli scarafaggi.

Advion gel scarafaggi deve essere impiegato in aree frequentate dagli insetti quali i diversi elementi della costruzione, tra mobili e pavimenti, aperture su spazi vuoti o fori presenti in pavimenti, muri, soffitti, gambe e base attrezzature, intorno a tubature idrauliche, porte, finestre, dietro e sotto gli elettrobomestici, armadi, lavandini, sanitari o qualsiasi altra apparecchiatura che gli scarafaggi possono usare per nascondersi.

Advion gel scarafaggi non deve essere applicato su superfici trattate di recentemente con insetticidi ad attività residuale.

DOSI D'IMPIEGO

- *Dose: 0.2-0.5 g/m²*
- *Applicare un minimo di 2 gocce di gel per m²*

Per il controllo del pesciolino d'argento: applicare tra 0,2 g (2 gocce Ø 5 mm) e fino a 0,5 g (5 gocce Ø 5 mm o 1 goccia Ø 10 mm) di gel per m², oppure applicare un sottile strato di gel lungo fino a 5 cm per m², con un massimo di undici applicazioni all'anno.

Un aumento del numero di gocce di gel (fino a 5 per m²) può risultare necessario in condizioni di forte infestazione, in particolari condizioni di sporco o quando predominano scarafaggio nero, blatta americana, pesciolino d'argento e pesciolino d'argento a coda lunga.

Nota:

- gocce da 5 mm di diametro pesano circa 0.1 g
- gocce da 10 mm di diametro pesano circa 0.5 g
- un sottile strato di gel da 5 cm di lunghezza x 3 mm di larghezza pesa circa

INFESTANTI TARGET

INSETTI STRISCIANTI
Blatte: (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*).
Pesciolino d'argento: (*Lepisma saccharina*, *Ctenolepisma longicaudata*)

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Bait gun classic
Multi dose bait gun
Stantuffi per siringhe

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.